

Anwendung und Hinweise

Bleichschiene mit Opalescence Gel

Anwendung:

- Ein Stecknadelkopf große Menge des Gels, pro Zahn, in der Schiene auftragen.
- Zahnaufhellungsschiene über die Zähne legen. Schiene vorsichtig andrücken, um das Zahnaufhellungsgel richtig zu verteilen. Wird die Schiene zu fest angedrückt, tritt das Gel aus der Schiene aus. Die Tragezeiten sind unterschiedlich. (10% Gel 8-10 Stunden oder über Nacht, 15% oder 16% Gel für 4-6 Stunden)
- Überschüssiges Aufhellungsgel mit einer weichen Zahnbürste oder dem Finger vom Zahnfleisch entfernen.
- Schiene nach Benutzung mit einer weichen Bürste und kaltem Wasser reinigen. Bewahren sie die Schiene in der mitgegebenen Aufbewahrungsbox auf.

Hinweise:

- Verfallsdatum beachten und Gel kühl und dunkel lagern (am besten im Kühlschrank)
- Schwangere oder stillende Patienten dürfen keine Zahnaufhellung vornehmen
- Keinen Tabak und Speisen konsumieren, während dem Tragen der Schiene
- Zahnersatz und Füllungen lassen sich nicht aufhellen
- Das Schlucken vom Gel vermeiden
- Durch bleichen können Zähne sensibler werden, dann Behandlung abbrechen (ggf. Zahnarzt kontaktieren)
- Kaffee, Tabak usw. können erneut Verfärbungen verursachen
- Falls Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum oder Zunge auftreten, die bereits 2 Tage anhalten bzw. sich zunehmen verschlechtern, bitte den Zahnarzt kontaktieren. Nach 1-3 Tagen und Abbruch der Behandlung, sollten die Beschwerden leichter werden

Bei Fragen wenden Sie sich gerne per Mail, Telefon oder über unser Kontaktformular auf der Website.